

ПАМЯТКА ПО ТИМПАНОМЕТРИИ



КЛИНИКА
УХА, ГОРЛА
И НОСА

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

ДОРОГОЙ ПАЦИЕНТ!

Поздравляем с назначением тимпанометрии — объективного метода оценки подвижности барабанной перепонки и давления в среднем ухе.

Это исследование помогает диагностировать отиты, тубоотит, разрыв цепи слуховых косточек. Чтобы результаты были точными, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями. **МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС НА КАЖДОМ ЭТАПЕ.**

Исследование безболезненно, длится 5–10 минут. В ухо вставляется мягкий силиконовый зонд, который создаёт небольшое давление. **НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ, ВО ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛЬЗЯ ГЛОТАТЬ, РАЗГОВАРИВАТЬ И ШЕВЕЛИТЬСЯ.**

• Тимпанометрия обязательна перед подбором слухового аппарата, при подозрении на экссудативный отит, разрыв цепи слуховых косточек. Нормальная тимпанограмма — высокий пик при нулевом давлении.

ЧТО ЭТО ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ

Зонд герметично закрывает слуховой проход. Прибор меняет давление в ухе от положительного до отрицательного и регистрирует подвижность барабанной перепонки. По форме тимпанограммы врач оценивает состояние среднего уха.

ЧТО МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ (ПОДГОТОВКА)

- **ОЧИСТИТЕ УШИ.**
За 2–3 дня при необходимости удалите серу у ЛОР-врача. Не используйте ватные палочки — они уплотняют серу и искажают результат.
- **НЕ ДВИГАЙТЕСЬ.**
Во время исследования нельзя глотать, разговаривать, кашлять, шевелиться. Если нужно сглотнуть — делайте это между измерениями.
- **НЕ ЕШЬТЕ ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ.**
За 1–2 часа воздержитесь от еды — частые глотательные движения могут исказить результат.
- **НЕ ЗАКАПЫВАЙТЕ КАПЛИ.**
В день исследования не закапывайте в ухо никакие капли без согласования с врачом.
- **СООБЩИТЕ О СИМПТОМАХ.**
Расскажите врачу о заложенности уха, боли, выделениях, снижении слуха, шуме, головокружении.
- **ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ.**
Паспорт, полис, направление. Предыдущие тимпанограммы — для сравнения в динамике.

ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ

- Не используйте ватные палочки для чистки ушей.
- Не закапывайте капли в уши в день исследования.
- Не сморкайтесь агрессивно за 2–3 часа до процедуры — отёк слизистой исказит результат.
- Не приходите при насморке или остром отите.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ

- Острый наружный отит (боль при касании уха).
 - Перфорация (отверстие) барабанной перепонки.
 - Обильные выделения из уха.
 - Выраженная заложенность носа при ОРВИ.
- СПАСИБО, ЧТО ДОВЕРИЛИ НАМ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ.
ТОЧНЫХ ВАМ РЕЗУЛЬТАТОВ!**

КОГДА НУЖНО ПРИЙТИ К ВРАЧУ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

- **ПЛАНОВЫЙ ОСМОТР:**
Придите к ЛОР-врачу с заключением. Врач по тимпанограмме оценит давление в ухе и подвижность перепонки. Или данную диагностику можно сделать прямо на приеме доктора и сразу получить заключение.
- **КОГДА ОБРАТИТЬСЯ СРОЧНО ДО ИССЛЕДОВАНИЯ:**
 - Внезапное ухудшение слуха.
 - Сильная боль в ухе.

**С ЗАБОТОЙ
О ВАШЕМ
ЗДОРОВЬЕ**

Наш телефон:
8 (495) 153-40-94
lorlor.ru